

Cánceres digestivos más frecuentes

1. Cáncer de esófago	2
2. Cáncer de estómago	2
3. Cáncer de colon y recto	2
4. Cáncer de hígado y metástasis hepáticas	3
5. Tumores neuroendocrinos gastrointestinales	3
6. Cáncer de vía biliar y vesícula biliar	3
7. Cáncer de páncreas	4
8. Cáncer de tiroides	4
9. Notas	5

1. Cáncer de esófago

- Incidencia: 2.358 (2016), tasa de 8/100.000 hombres y 1/100.000 mujeres
- Mortalidad: mal pronóstico, 1.830 casos al año (1,72% muertes por cáncer), supervivencia a los 5 años del 11,9%
- Otros: quinto más frecuente en España (mayoritariamente en hombres), principal factor de riesgo: alcohol

Bibliografía:

- https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiY1I3_tPfUAhVHnRQKHadNBYQQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Ffredecan.org%2Fes%2Fdownload_file.cfm%3Ffile%3D257%26area%3D196&usg=AFQjCNHUOFTTrUfnC_FbIYyAHSRPxnh5Ejw
- <http://www.seom.org/es/info-sobre-el-cancer/esofago?showall=1>

2. Cáncer de estómago

- Incidencia: 8.500 (2015)
- Mortalidad: supervivencia a los 5 años del 24,2% en hombres y 28,3% en mujeres. En los últimos años, la supervivencia del cáncer de estómago ha disminuido un 2,0% en mujeres y un 2,1% en hombres, con respecto a datos anteriores.
- Otros: El riesgo de padecer este cáncer aumenta a partir de los 50 años, situándose su mayor riesgo a partir de los 70 años de vida, siendo dos veces más frecuente en hombres que en mujeres.

Bibliografía:

- https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiY1I3_tPfUAhVHnRQKHadNBYQQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Ffredecan.org%2Fes%2Fdownload_file.cfm%3Ffile%3D257%26area%3D196&usg=AFQjCNHUOFTTrUfnC_FbIYyAHSRPxnh5Ejw
- <http://www.seom.org/es/info-sobre-el-cancer/estomago?start=2#content>

3. Cáncer de colon y recto

- Incidencia: 39.553 (2014); hombres (23482) y mujeres (16071)
- Prevalencia:
- Mortalidad: La supervivencia del cáncer colorrectal ha mejorado en los últimos años en España, situándose su supervivencia a los 5 años en un 56,4% en hombres y en 55,8% en mujeres.
- Otros: El cáncer colorrectal ha representado en 2015 el tumor más diagnosticado en España, siendo el segundo cáncer más incidente después del de próstata y del mama respectivamente.

Bibliografía:

- https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiY1I3_tPfUAhVHnRQKHadNBYQQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Ffredecan.org%2Fes%2Fdownload_file.cfm%3Ffile%3D257%26area%3D196&usg=AFQjCNHUOFTTrUfnC_FbIYyAHSRPxnh5Ejw
- <http://www.seom.org/es/info-sobre-el-cancer/colon-recto?start=2#content>

4. Cáncer de hígado y metástasis hepáticas

- Incidencia: 5.862 (2015), tasa de 14,1/100.000
- Mortalidad: 5.039 casos al año, supervivencia a los 5 años de más del 50% tras cirugía completa, aunque la tasa de recurrencia a los 5 años es mayor al 70%
- Otros: séptimo tumor más frecuente en España

Bibliografía

- http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/Las_cifras_del_cancer_en_Esp_2017.pdf
- https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiY1I3_tPfUAhVHnRQKHadNBYQQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Ffredecan.org%2Fes%2Fdownload_file.cfm%3Ffile%3D257%26area%3D196&usq=AFQjCNHUOFTTrUfnC_FbIYyAHSRPxnh5Ejw
- <http://www.seom.org/es/info-sobre-el-cancer/higado?start=1#content>
- <https://www.aecc.es/SOBREELCANCER/CANCERPORLOCALIZACION/CANCERDEHIGADO/Paginas/pronostico.aspx>

5. Tumores neuroendocrinos gastrointestinales

Las NENs presentan una incidencia de 5.25 casos por cada 100.000 habitantes, siguiendo este mismo parámetro una evolución al alza en los últimos 30 años. En contraste con la baja incidencia de estas neoplasias, su prevalencia sí que es significativa. Esto es debido a la historia de la enfermedad, caracterizada por un lento crecimiento y una larga supervivencia ante la misma, situándose la TNE como la segunda neoplasia más prevalente del tracto digestivo, justo después del cáncer colorectal.

Bibliografía:

- <http://www.seom.org/es/info-sobre-el-cancer/tumor-neuroendocrino?showall=1>
- <http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-tumores-neuroendocrinos-gastrointestinales-pancreaticos-13091016>

6. Cáncer de vía biliar y vesícula biliar

- Incidencia: Ha aumentado en los últimos años en los países desarrollados
- Prevalencia: El cáncer de vesícula o colangiocarcinoma representa el 3% de todos los cánceres digestivos. El cáncer de la vesícula biliar se ha convertido en el quinto cáncer más prevalente del aparato digestivo.
- Mortalidad: 2.133 (2016), sin cirugía una supervivencia de 6m-1 año
- Otros: dentro de los cánceres de la vía biliar y vesícula, el cáncer de vesícula es el más frecuente

Bibliografía:

- <http://www.seom.org/es/info-sobre-el-cancer/via-biliar?showall=1>
- http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/Las_cifras_del_cancer_en_Esp_2017.pdf

7. Cáncer de páncreas

La gran relevancia del cáncer de páncreas a nivel social no estriba en su incidencia, de por sí baja con respecto a otros tipos de cáncer, sino que adquiere gran relevancia debido a los elevados datos de su mortalidad asociada

- Incidencia: 4.000 (2016), en aumento
- Mortalidad: 4.400 personas, ligeramente superior en hombres que en mujeres
- Otros: el diagnóstico se suele realizar en estadios avanzados de la enfermedad, lo cual ocasiona una mortalidad que ronda casi el 100%

Bibliografía:

- <http://www.seom.org/es/info-sobre-el-cancer/pancreas?start=1#content>
- <https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerPorLocalizacion/cancerdepancreas/Paginas/Incidencia.aspx>

8. Cáncer de tiroides

- Incidencia: 3.307 (2016), <1% cánceres malignos, 2-20 casos/100.000 habitantes, siendo más frecuente en mujeres que en hombres (5-1,9/100.000 casos, respectivamente)
- Mortalidad: tras diagnóstico en etapa inicial más cirugía, la supervivencia a los 20 años es entorno al 91%

Bibliografía:

- http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/Las_cifras_del_cancer_en_Esp_2017.pdf
- <http://www.seom.org/es/info-sobre-el-cancer/tiroides?showall=1>
- <https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerPorLocalizacion/cancerdetiroides/Paginas/Pronostico.aspx>
- <http://www.elsevier.es/es-revista-endocrinologia-nutricion-12-articulo-carcinoma-diferenciado-tiroides-supervivencia-factores-S1575092211000635>

9. Notas

incidencia= nº de casos nuevos al año en españa

prevalencia= nº de personas que tienen la enfermedad en españa

Recopilación realizada el 21 de agosto de 2017 por:
Natalia Borrás Quintero. Graduada en Enfermería